

# Département Hydrométrie et Prévision des Crues Vienne Charente Atlantique

## Antenne de La Rochelle

**CQE du 12 avril 2018**

-

**Etat de la ressource en eau superficielle**


**À début avril 2018**



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

# Bassin de la Sèvre Niortaise







**Au mois de mars 2018, les débits à Niort (La Tiffardière) sur La Sèvre Niortaise se situent au dessus de la normale (3 ans humide sur QMM).**

# Bassin de la Charente







**Au mois de mars 2018, les débits à Saint-Séverin-sur-Boutonne (Moulin de Châtre) sur La Boutonne se situent largement au dessus de la normale (7 ans humide).**



**Au mois de mars 2018, les débits à Salles d'Angles (les Perceptiers) sur Le Né se situent au dessus de la normale (3 à 4 ans humide).**



**Au mois de mars 2018, les débits à Saint-Seurin-de-Palenne (la Lijardière) sur La Seugne se situent au dessus de la normale (5 ans humide).**




**Au mois de mars 2018, les débits à Chaniers (Beillant) sur La Charente se situent au dessus de la normale (3 à 4 ans humide).**



# Bassin de la Seudre





**Au mois de mars 2018, les débits à St André de Lidon sur La Seudre se situent au dessus de la normale (5 à 6 ans).**

# Conclusion

**Après un étiage 2017 prononcé où les débits mesurés franchissaient le QMNA 5, la tendance est depuis trois mois à des débits hivernaux supérieurs à la normale.**

